

## **MECOBAL** Injections (MECOBALAMIN JP)

### **COMPOSITION:**

Each 1ml ampoule contains:  
Mecobalamin JP ... 500 mcg.  
NQ's Specs.

**INTRODUCTION:** Mecobal is a brand name of Mecobalamin, co-enzyme type vitamin B<sub>12</sub> that occurs in the blood and the cerebrospinal fluid. It is transported to nerve cells more rapidly than other analogues of vitamin B<sub>12</sub>. Mecobalamin is useful for the treatment of numbness, pain and paralysis due to peripheral neuropathies and megaloblastic anemia.

**INDICATIONS:** Peripheral neuropathies such as diabetic neuropathy and polyneuritis, megaloblastic anemia due to vitamin B<sub>12</sub> deficiency.

**DOSE AND ADMINISTRATION:** The usual adult daily dose is one ampoule (500mcg Mecobalamin), administered intramuscularly or intravenously once a day at the frequency of three times a week. For the treatment of megaloblastic anemia usual adult daily dose is 1 ampoule (500mcg Mecobalamin) administered intramuscularly or intravenously once a day at the frequency of three times a week. After approximately 2 months of medication the dose should be reduced to a single administration of one ampoule at 1 to 3 months intervals for maintenance therapy. The dosage may be increased or decreased according to the age of patients and the severity of symptoms.

### **CONTRA INDICATIONS:**

Hypersensitivity to mecobalamin or other B<sub>12</sub> containing products.

**PRECAUTIONS:** Mecobalamin should not be used for more than one month unless it is effective. Prolonged use of larger doses of Mecobalamin is not recommended for patients who are directly involved in handling of mercury and its compounds. Use of drug should be discontinued if symptoms of hypersensitivity such as eruption occurs. Since this drug decomposes on exposure to light, it should be used immediately after the package is opened.

In intramuscular administration, care should be exercised to avoid adverse effects on tissues or nerves. Repeated injections at the same site should be avoided. Particular care should be exercised when administering the drug to neonates, premature infants, infants and children.

The course of nerves should be avoided for the site of injection. If the patient complains of pain or blood reflux occurs when the syringe is struck, withdraw it immediately and try at a different site.

**ADVERSE REACTIONS:** Loss of appetite, nausea, diarrhoea or other symptoms of gastrointestinal upsets may rarely occur.

### **INSTRUCTIONS:**

Store below 30°C.  
Protect from light, if exposed to light potency may be affected.  
Keep out of the reach of children.

**PRESENTATION:** Pack of 10's x 1 ml ampoule.



**Manufactured for:**  
**NABIQASIM INDUSTRIES (PVT) LTD.**  
17/24, Korangi Industrial Area, Karachi - Pakistan.

**Manufactured by:**  
**Surge Laboratories (Pvt.) Ltd.,**  
10th Km, Faisalabad Road,  
Bikhi, District Shekhupura-Pakistan.

Rev: 09-07/2

## میکوبال انجکشن (میکوبال امین)

اجزاء ترکیب :

ہر اینٹی بیول میں ۵۰۰ مائیکروگرام میکوبال امین فی ملی لیٹر موجود ہے۔

فوائد :

میکوبال اعصابی درد کے لئے مفید ہے خاص طور پر ذیابیطس کے مریضوں میں اعصابی درد اور ذیابیطس کی وجہ سے اعصابی پیچیدگیوں کے لئے مفید ہے۔

خوراک اور استعمال :

انجکشن کا ایک اینٹی بیول ہفتہ میں ۳ مرتبہ استعمال کریں۔ اگر مرض میں شدت ہو تو خوراک کو بڑھایا جاسکتا ہے۔

بچوں میں ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں۔

احتیاط :

میکوبال سے اگر کسی کو الرجی ہو تو اس کے استعمال سے گریز کریں۔ یا

ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں۔

ہدایات :

30 ڈگری سینٹی گریڈ سے کم درجہ حرارت پر رکھیں۔

دوا کو روشنی سے دور رکھیں اگر دوا پر روشنی کا اثر ہو تو دوا کا اثر ختم ہو جائے گا۔

بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔

پیشکش :

ہر پیک میں میکوبال انجکشن کے دس اینٹی بیولز دستیاب ہیں۔

فروخت کنندگان : نبی قاسم انڈسٹریز (پرائیویٹ) لمیٹڈ

۱۷۲۳، کورنگی انڈسٹریل ایریا، کراچی۔ پاکستان۔



تیار کنندگان : سرچ لیبارٹریز (پرائیویٹ) لمیٹڈ

10th KM، فیصل آباد روڈ، کبھی، ڈسٹرکٹ شیخوپورہ۔ پاکستان۔